

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ

ГРИПП ПТИЦ - острая высоко контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся явлениями септицемии, поражением респираторной и пищеварительной систем, большинства внутренних органов.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ - больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы. Факторы передачи - пух, перо, подстилка, трупы и тушки убитых птиц, контаминированное оборудование и инвентарь, корма, транспорт, персонал, грызуны, насекомые, дикие птицы.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – 3-5 суток.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- **Сверхострое течение** - внезапная гибель птиц без проявления каких-либо признаков болезни
- **Острое течение** – угнетенное состояние, сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъюктивит, повышение температуры тела, диарея, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородок и лап, шаткость походки, судороги, парезы, параличи.

У кур-несушек – резко снижается продуктивность(вплоть до полного прекращения яйценоскости). Смертность может достигать 100 %.

У водоплавающих птиц – при заражении высоковирулентными штаммами нарушение координации движений, искривление и заворот шеи, иногда развивается помутнение роговицы глаз. Болезнь может протекать бессимптомно, птицы длительное время остаются вирусоносителями.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Студенистые инфильтраты желтовато-красноватого цвета в подкожной клетчатке, скопление экссудата в грудобрюшной и перикардиальной полостях, кровоизлияния на серозных и слизистых покровах, сердце, печени. Оболочки головного мозга гиперемированы, с пятнистыми кровоизлияниями, печень, почки, брыжейка и серозные оболочки кишечника застойно гиперемированы.

ПРОФИЛАКТИКА

- недопущение заноса возбудителя инфекции
- соблюдение режима хозяйства закрытого типа
- завоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных хозяйств
- вакцинация: используют инактивированные вакцины

МЕРЫ БОРЬБЫ

Больную и подозрительную по заболеванию птицу убивают бескровным методом и сжигают, проводят очистку и дезинфекцию зданий и оборудования, помет уничтожают.

Осуществляют комплекс прочих противоэпизоотических мероприятий в соответствии с Правилами по борьбе с гриппом птиц, Правилами лабораторной диагностики гриппа А птиц.

В СЛУЧАЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ПТИЦЫ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В РАЙОННУЮ ИЛИ КРАЕВУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ

Также всю интересующую информацию можно получить в БУОО «Орловском ОВЦ» Орловском филиале (Орловская область, Орловский район, п.Зареченский, ул. Новая, д.4)
телефоны 74-65-08, 8(960)-644-78-11; e-mail: orel_raivet@mail.ru